


Enquête auprès des professionnels libéraux sur la prise en charge de la douleur

Résultats détaillés

Description de l'échantillon

- 1 087 questionnaires reçus pour 10 000 envois soit un **taux de retour moyen de 10,9%**

	Nombre de réponses	%	% hors réponses manquantes	% cumulé hors réponses manquantes
Kinésithérapeute	208	19,1	19,4	19,4
Sage-femme	17	1,6	1,6	20,9
Infirmière	201	18,5	18,7	39,7
Chirurgien dentiste	248	22,8	23,1	62,8
Médecin spécialiste	180	16,6	16,8	79,5
Médecin généraliste	220	20,2	20,5	100
Total hors réponses manquantes	1074	98,8	100	
Réponses manquantes	13	1,2		
Total	1087	100		



	Réponses (valeur absolue)	%	Effectif France	%
Médecin spécialiste	180	45	54 140	46,5
Médecin généraliste	220	55	62 253	53,5
Total	400	100	116 393	100


- La répartition des réponses entre généralistes et spécialistes est représentative de la distribution des médecins français ($p < 0,05$)

Spécialité déclarée

Catégorie professionnelle	Spécialité déclarée																		
	Anesthésiste	Cardiologue	Chirurgien viscéral	Dermatologue	Gastro-entérologue	Gynécologue médical	Gynécologue obstétricien	Interniste	Neurologue	Ophthalmologiste	ORL	Orthopédie	Pédiatre	Pneumologie	Psychiatrie	Radiologie	Rhumatologie	Chirurgie générale	Total
Spécialiste	23	8	6	15	8	15	7	2	3	10	4	4	17	4	20	4	13	3	166
Effectif échantillon	128	155	—	127	82	27	193	24	29	178	91	61	113	43	251	186	73	117	1878
Taux de réponse	18,0%	5,2%	—	11,8%	9,8%	55,6%	3,6%	8,3%	10,3%	5,6%	4,4%	6,6%	15,0%	9,3%	8,0%	2,2%	17,8%	2,6%	8,8%

- 174 professionnels libéraux ont déclarés une spécialité dont 4 médecins généralistes, 2 dentistes, 1 IDE et 1 kiné.
- Pour les médecins spécialistes, sur les 180 répondants, 166 ont indiqué une spécialité référencée.
- Les spécialités non indiquées dans la liste sont : gériatrie (2), chirurgie vasculaire (2), médecine du travail (1).

	Homme	Femme	Total	Sexe ratio Homme-Femme
Médecin généraliste	150	62	212	71% - 29%
Médecin spécialiste	93	81	174	53% - 47%
Chirurgien dentiste	142	95	237	58% - 42%
Infirmière	34	159	193	18% - 82%
Sage femme	0	16	16	0% - 100%
Kinésithérapeute	129	69	198	65% - 35%
Total	548	482	1 030	53% - 47%



- 53,2% d'hommes / 46,8% de femmes
- Analyse réalisée parmi les praticiens libéraux ayant répondu au questionnaire et ayant rempli à la fois l'item catégorie professionnelle et l'item Sexe. Dans 57 cas (5,2%) l'une des valeurs au moins était absente

Nombre d'années d'installation

	10 ans ou moins	11 à 20 ans	21 à 30 ans	31 ans ou plus	Total
Médecin généraliste	53	78	71	18	220
Médecin spécialiste	36	76	57	11	180
Chirurgien dentiste	68	68	77	32	245
Infirmière	54	86	46	13	199
Sage femme	11	2	2	2	17
Kinésithérapeute	54	62	50	42	208
Total	276	372	303	118	1069
Part du total	25,8%	34,8%	28,3%	11,0%	

Pour 18 questionnaires une réponse au moins était absente

- Plus de 60% des répondants sont installés depuis moins de 20 ans et près d'un quart le sont depuis moins de 10 ans


Répartition régionale des réponses (1)

	Réponses	%	% (hors non précisé)	% cumulés	Questionnaires envoyés	Taux de retour (%)
Alsace	36	3,3	3,4	3,4	260	13,8
Aquitaine	59	5,4	5,5	8,9	581	10,2
Auvergne	17	1,6	1,6	10,5	215	7,9
Basse Normandie	22	2,0	2,1	12,6	182	12,1
Bourgogne	33	3,0	3,1	15,7	222	14,9
Bretagne	58	5,3	5,5	21,1	493	11,8
Centre	36	3,3	3,4	24,5	311	11,6
Champagne Ardennes	17	1,6	1,6	26,1	163	10,4
Corse	3	0,3	0,3	26,4	66	4,5
Franche Comté	17	1,6	1,6	28,0	141	12,1
Guadeloupe	3	0,3	0,3	28,3	47	6,4
Haute Normandie	20	1,8	1,9	30,2	213	9,4
Ile de France	140	12,9	13,2	43,3	1 856	7,5
Languedoc Roussillon	80	7,4	7,5	50,8	559	14,3
Limousin	13	1,2	1,2	52,1	120	10,8
Lorraine	34	3,1	3,2	55,3	300	11,3
Midi Pyrénées	75	6,9	7,0	62,3	569	13,2
Nord Pas de Calais	59	5,4	5,5	67,9	529	11,2
Pays de la Loire	49	4,5	4,6	72,5	430	11,4
Picardie	17	1,6	1,6	74,1	212	8,0
Poitou Charentes	36	3,3	3,4	77,4	238	15,1
Provence Alpes Côte d'Azur	104	9,6	9,8	87,2	1 162	9,0
Rhône Alpes	136	12,5	12,8	100	969	14,0
Total	1 064	97,9	100			
Non précisé	23	2,1				
Total	1 087	100			10000	10,6


Guyane, Réunion & Martinique : aucune réponse / taux de retour = 0%

- La part des réponses selon les régions est variable et s'échelonne (hormis Guyane, Martinique & Réunion) entre 4,5% pour la Corse et 15,1% pour la région Poitou Charentes

Cartographie du nombre des réponses



Cartographie des taux de réponse



Catégorie professionnelle

	Médecins généralistes			Médecins spécialistes			Chirurgiens dentistes			Sages-femmes			Infirmières			Kinés			Total		
	R*	E**	Tx***	R*	E**	Tx***	R*	E**	Tx***	R*	E**	Tx***	R*	E**	Tx***	R*	E**	Tx***	Total R	Total E	Tx
Alsace	8	70	11,4%	10	63	15,9%	9	47	19,1%	0	2	0,0%	3	44	6,8%	6	32	18,8%	36	258	14,0%
Aquitaine	14	133	10,5%	5	116	4,3%	15	86	17,4%	1	5	20,0%	8	154	5,2%	16	87	18,4%	59	581	10,2%
Auvergne	1	53	1,9%	2	37	5,4%	4	33	12,1%	0	1	0,0%	7	54	13,0%	3	37	8,1%	17	215	7,9%
Basse Normandie	4	50	8,0%	2	34	5,9%	7	22	31,8%	0	2	0,0%	5	49	10,2%	4	26	15,4%	22	183	12,0%
Bourgogne	6	60	10,0%	8	43	18,6%	9	31	29,0%	0	2	0,0%	2	51	3,9%	8	36	22,2%	33	223	14,8%
Bretagne	13	115	11,3%	5	83	6,0%	16	72	22,2%	1	3	33,3%	16	139	11,5%	6	82	7,3%	57	494	11,5%
Centre	5	85	5,9%	4	64	6,3%	10	45	22,2%	1	2	50,0%	8	64	12,5%	8	51	15,7%	36	311	11,6%
Champagne Ardennes	4	47	8,5%	5	34	14,7%	2	26	7,7%	0	2	0,0%	3	32	9,4%	3	23	13,0%	17	164	10,4%
Corse	1	12	8,3%	0	11	0,0%	0	8	0,0%	0	0	SO	2	24	8,3%	0	11	0,0%	3	66	4,5%
Franche Comté	2	44	4,5%	2	29	6,9%	2	20	10,0%	1	1	100%	4	28	14,3%	5	18	27,8%	16	140	11,4%
Guadeloupe	1	11	9,1%	0	9	0,0%	1	5	20,0%	0	0	SO	1	16	6,3%	0	6	0,0%	3	47	6,4%
Haute Normandie	7	64	10,9%	4	44	9,1%	1	26	3,8%	0	1	0,0%	6	47	12,8%	2	31	6,5%	20	213	9,4%
Ile de France	33	392	8,4%	34	507	6,7%	40	328	12,2%	1	16	6,3%	10	257	3,9%	20	356	5,6%	138	1 856	7,4%
Languedoc Roussillon	11	117	9,4%	14	95	14,7%	16	67	23,9%	2	6	33,3%	20	184	10,9%	16	89	18,0%	79	558	14,2%
Limousin	5	33	15,2%	2	20	10,0%	2	14	14,3%	0	1	0,0%	1	35	2,9%	3	18	16,7%	13	121	10,7%
Lorraine	11	85	12,9%	4	62	6,5%	8	51	15,7%	1	3	33,3%	4	60	6,7%	6	38	15,8%	34	299	11,4%
Midi Pyrénées	13	117	11,1%	8	104	7,7%	16	78	20,5%	0	5	0,0%	27	183	14,8%	11	83	13,3%	75	570	13,2%
Nord Pas de Calais	11	160	6,9%	8	94	8,5%	20	67	29,9%	1	2	50,0%	9	104	8,7%	10	102	9,8%	59	529	11,2%
Pays de la Loire	6	119	5,0%	7	82	8,5%	14	67	20,9%	2	6	33,3%	7	81	8,6%	12	75	16,0%	48	430	11,2%
Picardie	3	65	4,6%	2	39	5,1%	1	29	3,4%	0	1	0,0%	4	45	8,9%	7	33	21,2%	17	212	8,0%
Poitou Charentes	10	69	14,5%	6	45	13,3%	8	32	25,0%	1	2	50,0%	6	55	10,9%	5	36	13,9%	36	239	15,1%
Provence Alpes Côte d'Azur	21	225	9,3%	22	240	9,2%	19	152	12,5%	0	9	0,0%	27	327	8,3%	15	209	7,2%	104	1 162	9,0%
Rhône Alpes	29	218	13,3%	21	195	10,8%	27	141	19,1%	4	10	40,0%	19	226	8,4%	35	179	19,6%	135	969	13,9%
Total	219	2 344	9,3%	175	2 050	8,5%	247	1 447	17,1%	16	82	19,5%	199	2 259	8,8%	201	1 658	12,1%	1 057	9 840	10,7%

R
é
g
i
o
n
d
,
e
x
e
r
c
i
c
e

R* : Réponses reçues

E** : Questionnaires envoyés

Tx***: Taux de retour

Enquête auprès des professionnels libéraux

Réponses des médecins

- 398 médecins ont répondu à la question 1 **concernant la formation initiale sur la prise en charge de la douleur.**
- 73 d'entre eux ont reçu une formation soit 18,3%.

Catégorie professionnelle


		Généraliste		Spécialiste		Total	
Q1 : Formation initiale	Oui	41	18,6%	32	18,0%	73	18,3%
	Non	179	81,4%	146	82,0%	325	81,7%
	Total	220	100%	178	100%	398	100%

- La différence entre généraliste & spécialiste n'est pas significative ($p > 0,05$)
- Quel que soit le mode d'exercice (généraliste ou spécialiste), moins d'un médecin sur cinq a reçu une formation sur la prise en charge de la douleur au cours de ses études de médecine.
- Les anesthésistes ont reçu une formation sur la douleur de façon significativement plus fréquente ($p < 0,05$), soit 43,5% des anesthésistes.

Formation adaptée à votre exercice?

		Tout à fait d'accord	D'accord	Pas d'accord	Pas du tout d'accord	Total
Formation	Oui	14	36	22	1	73
		19%	49%	30%	1%	
		50		23		
		68%		32%		
Non	6	3	5	2	16	
Total	20	39	27	3	89	

La formation reçue était elle adaptée?



- Bien que 73 praticiens aient déclaré avoir reçu, au cours de leurs études, une formation à la prise en charge de la douleur (Q1), 89 ont répondu à la question 2, qui permettait de qualifier cette formation.
- Sur ceux qui avaient répondu « oui » à la question 1, 68% ont trouvé leur formation initiale sur la douleur adaptée à leur exercice.
- Il n'y a pas de différence significative entre généralistes et spécialistes pour cet item ($p > 0,05$)

- 228 praticiens libéraux déclarent avoir participé à des séances de formation continue sur le thème de la douleur, soit environ 60%.
- Il n'y a pas de différence significative entre les praticiens qui ont reçu un enseignement sur la douleur au cours de leurs études de médecine et ceux qui n'en ont pas reçu ($p > 0,05$).

Formation continue sur la douleur

		Oui		Non		Total
Formation initiale sur la douleur	Oui	40	59%	28	41%	68
		18%		18%		100%
	Non	188	60%	127	40%	315
		82%		82%		100%
Total	228	100%	155	100%	383	

- 212 des 228 praticiens ayant répondu à la question 3 (FMC) ont défini le type de formation continue qu'ils ont suivie.
- 6 personnes qui n'ont pas déclaré avoir suivi de formation de ce type ont répondu à la question 3a.
- 35 praticiens sur les 218 ont suivi une **formation diplômante (16%)**.
- 34% ont participé à des congrès traitant du thème de la douleur.
- 24% ont reçu une formation au cours de séminaires organisée par l'industrie pharmaceutique.
- 74% ont déclaré avoir participé à un EPU.
- 34% ont reçu au moins 2 types de formation et 12%, 3.
- 5 praticiens ont cumulé l'ensemble des items.

	Effectif	%	% (hors FMC non suivie)	% cumulés
FD	15	3,8	6,9	6,9
C	25	6,3	11,5	18,3
S	14	3,5	6,4	24,8
EPU	89	22,3	40,8	65,6
FD + C	1	0,3	0,5	66,1
FD + EPU	8	2,0	3,7	69,7
C + S	1	0,3	0,5	70,2
C + EPU	24	6,0	11,0	81,2
S + EPU	16	4,0	7,3	88,5
FD + C + S	1	0,3	0,5	89,0
FD + C + EPU	3	0,8	1,4	90,4
FD + S + EPU	2	0,5	0,9	91,3
C + S + EPU	14	3,5	6,4	97,7
FD + C + S + EPU	5	1,3	2,3	100
Total	218	54,5	100	
Pas de Formation suivie ou indiquée	182	45,5		
Total	400	100		

FD : Formation diplômante / C : Congrès
S : séminaire pharmaceutique / EPU : Enseignement Post Universitaire

La formation continue vous a-t-elle paru adaptée à votre exercice ?

	Tout à fait d'accord		D'accord		Sous-groupe d'accord		Pas d'accord		Pas du tout d'accord		Sous-groupe pas d'accord		Pas de réponse		Total
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	
Formation Diplômante	22	63%	9	26%	31	89%	3	9%	0	0%	3	9%	1	3%	35
Congrès	31	42%	32	43%	63	85%	8	11%	0	0%	8	11%	3	4%	74
Séminaire pharmaceutique	20	38%	32	60%	52	98%	0	0%	0	0%	0	0%	1	2%	53
Enseignement Post Universitaire	56	35%	90	56%	146	91%	8	5%	2	1%	10	6%	5	3%	161

75 praticiens libéraux ont suivi au moins deux types de formation continue

- Une grande majorité des répondants (entre 85% & 98% des réponses "tout à fait d'accord" & "d'accord") estiment que la formation continue qu'ils ont reçue est adaptée à leur exercice.

Fournisseurs d'informations les plus utiles sur le thème de la douleur

	Médecins		Médecins généralistes		Médecins spécialistes	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Presse médicale	275	68,8	152	69,1	123	68,3
Industrie pharmaceutique	149	37,3	80	36,4	69	38,3
Médecin référent douleur	146	36,5	76	34,5	70	38,9
Associations de professionnels	118	29,5	72	32,7	46	25,6
Agences nationales	76	19,0	50	22,7	26	14,4
Universités	72	18,0	46	20,9	26	14,4
Ministère de la santé	17	4,3	7	3,2	10	5,6
Associations d'usagers & de patients	13	3,3	9	4,1	4	2,2

3 réponses maximum pouvaient être données

- La **presse médicale** est la première source d'information sur la douleur pour les praticiens, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, suivie par **l'industrie pharmaceutique** et les **médecins référents douleur**.

- Les informations les plus attendues par les médecins libéraux sont essentiellement :
 1. Conseils de prescription ou de traitement
 2. Informations sur les structures locales de prise en charge de la douleur
 3. Recommandations professionnelles

Quelles informations vous manquent le plus ?

	Médecins		Médecins généralistes		Médecins spécialistes	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Conseils de prescription	183	45,8	87	39,5	96	53,3
Informations sur les structures locales de prise en charge	162	40,5	91	41,4	71	39,4
Recommandations	144	36,0	86	39,1	58	32,2
Présentations de sessions de FMC	121	30,3	73	33,2	48	26,7
Réglementations	80	20,0	39	17,7	41	22,8
Présentations d'antalgiques	70	17,5	24	10,9	46	25,6

3 réponses maximum pouvaient être données

- La présentation d'antalgiques est l'information qui manque le moins aux généralistes mais pas aux spécialistes ($p < 0,05$).

- 397 médecins ont répondu à la question 6 : « Évaluez-vous la douleur de vos patients ? »

Catégorie professionnelle

Évaluation de la douleur ?	Généralistes		Spécialistes		Total	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
	Oui	196	89,1	150	84,7	346
Non	24	10,9	27	15,3	51	12,8
Total	220	100	177	100	397	100,0

- 87% des médecins interrogés ont déclaré évaluer la douleur de leur patients. La différence entre généralistes et spécialistes n'apparaît pas significative ($p > 0,05$).

- Sur les 397 médecins ayant déclaré évaluer la douleur de leurs patients, 55 n'ont pas explicité les moyens qu'ils utilisent.

Catégorie professionnelle

		Catégorie professionnelle				
		Généralistes (197 répondants)		Spécialistes (149 répondants)		Total
Moyens d'évaluation	Utilisation d'outils standardisés	80	41,5	49	32,9	129
	Moyens propres	166	86,0	129	86,6	295

Les praticiens avaient la possibilité de cocher les 2 cases éventuellement

- 41,5% des généralistes et 33% des spécialistes déclarent utiliser un outil standardisé pour évaluer la douleur.
- L'outil d'évaluation le plus cité est l'Echelle Visuelle Analogique (EVA).

Les médecins : prévention de la douleur induite (1)

Catégorie professionnelle

Q7 utilisez vous un traitement préventif pour les douleurs induites ?

	Médecins généralistes			Médecins spécialistes			Total
	Nombre	%	sous totaux	Nombre	%	sous totaux	
Souvent	72	46,5%	79,4%	68	53,1%	82,0%	140
Parfois	51	32,9%		37	28,9%		88
Rarement	22	14,2%	20,6%	12	9,4%	18,0%	34
Jamais	10	6,5%		11	8,6%		21
Total	155	100%	100%	128	100%	100%	283

- 117 praticiens n'ont pas répondu à la question concernant la prévention de la douleur induite par les actes diagnostiques ou thérapeutiques.
- Environ 80% des répondants déclarent prescrire un traitement préventif « souvent » ou « parfois ».

- 139 médecins n'ont pas répondu à la question 7a.
- 10 praticiens déclarant ne jamais prescrire de traitement préventif ont répondu.

Quel type de traitement préventif prescrivez vous le plus souvent ?

		Anesthésique local	Antalgique	Anxiolytique	Anesthésique + antalgiques	Anesthésique + anxiolytique	Antalgique + anxiolytique	Anesthésique + antalgique + anxiolytique	Total
Q7 utilisez vous des antalgiques en préventif ?	Souvent	50	35	5	21	5	8	12	136
	Parfois	35	12	10	11	3	9	7	87
	Rarement	6	14	3	2	1	1	1	28
	Jamais	2	3	2	2	0	1	0	10
	Total	93	64	20	36	9	19	20	261

Les médecins : prescription d'antalgiques de palier III (1)

Catégorie professionnelle

	Médecins généralistes		Médecins spécialistes		Total
	Nombre	%	Nombre	%	
Souvent	60	27,4%	40	22,9%	100
Parfois	113	51,6%	29	16,6%	142
Rarement	40	18,3%	38	21,7%	78
Jamais	6	2,7%	68	38,9%	74
Total	219	100%	175	100%	394

Q8 : Prescrivez-vous des antalgiques de niveau III

- Sur les 400 praticiens ayant renvoyé le questionnaire, 6 n'ont pas répondu à la question concernant la prescription d'antalgiques de niveau III
- Les généralistes prescrivent en moyenne plus d'antalgiques de palier III que les spécialistes. Mais cette différence est à peine significative ($p=0,053$).

Les médecins : prescription d'antalgiques de palier III (2)

- 91 praticiens n'ont pas répondu à la question 8a.
- 12 médecins ont coché les deux cases :
 - Prescription par renouvellement
 - Prescription de sa propre initiative
- Près de 80% des médecins déclarent prescrire des antalgiques de palier III de leur propre initiative. Il n'y a pas de différence significative entre généralistes & spécialistes

Catégorie professionnelle

Modalité de prescription des antalgiques de niveau III	Médecins généralistes		Médecins spécialistes		Total
	Nombre	%	Nombre	%	
	Renouvellement	36	17,9%	19	20,0%
Prescription de sa propre initiative	165	82,1%	76	80,0%	241
Total	201	100%	95	100%	296

Catégorie professionnelle

Prescrivez-vous des analgésiques de niveau III pour des douleurs aiguës ?

	Médecins généralistes		Médecins spécialistes			Total	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
Souvent	81	37,9%	54	54,5%	135	43,1%	
Parfois	80	37,4%	25	25,3%	105	33,5%	
Rarement	47	22,0%	15	15,2%	62	19,8%	
Jamais	6	2,8%	5	5,1%	11	3,5%	
Total	214	100%	99	100%	313	100%	

- 313 praticiens ont répondu à la question 8b.
- Il n'y a pas de différence significative entre généralistes et spécialistes quant à la prescription d'analgésiques de palier III pour les douleurs aiguës.
- Les praticiens ayant participé à au moins une séance de **formation sur la prise en charge de la douleur** prescrivent significativement **plus d'analgésiques de palier III dans les douleurs aiguës** que les autres ($p < 0,05$).

Les médecins : prescription d'analgésiques de palier III pour les douleurs chroniques

- 86 médecins n'ont pas répondu à la question 8c.
- De façon significative ($p < 0,05$), les spécialistes prescrivent moins souvent des analgésiques de palier III pour des douleurs chroniques que les généralistes.
- De façon significative, les praticiens ayant participé à au moins une séance de formation sur la prise en charge de la douleur prescrivent plus d'analgésiques de niveau III dans les douleurs chroniques que les autres.

Catégorie professionnelle

Prescrivez-vous des analgésiques de niveau III pour des douleurs chroniques ?

	Médecins généralistes		Médecins spécialistes			Total	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%	
Souvent	122	57,0%	32	32,0%	154	49,0%	
Parfois	74	34,6%	35	35,0%	109	34,7%	
Rarement	15	7,0%	23	23,0%	38	12,1%	
Jamais	3	1,4%	10	10,0%	13	4,1%	
Total	214	100%	100	100%	314	100%	

Quelles sont les douleurs les plus complexes à traiter ?

	Total des médecins (335 réponses)		Médecins généralistes* (216 réponses)		Médecins spécialistes** (119 réponses)	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Douleurs neurologiques	218	65,1%	159	73,6%	59	49,6%
Douleurs cancéreuses	163	48,7%	117	54,2%	46	38,7%
Douleurs rhumatologiques	111	33,1%	85	39,4%	26	21,8%
Douleurs gastroentérologiques	47	14,0%	28	13,0%	19	16,0%
Douleurs urogynécologiques	32	9,6%	16	7,4%	16	13,4%
Douleurs ORL/ophtalmologiques	31	9,3%	14	6,5%	17	14,3%
Douleurs dermatologiques	22	6,6%	12	5,6%	10	8,4%
Douleurs traumatologiques	21	6,3%	15	6,9%	6	5,0%

* : 4 médecins généralistes sur 220 (1,8%) n'ont coché aucune des cases

** : 61 médecins spécialistes sur 180 (33,8%) n'ont coché aucune des cases

- Pour l'ensemble des praticiens, les douleurs d'origine neurologiques sont les plus complexes à traiter suivies des douleurs cancéreuses et des douleurs rhumatologiques.
- 2 neurologues sur les trois ayant répondu ont déclaré que les douleurs d'origine neurologique étaient difficiles à traiter.
- 6 rhumatologues sur les 13 ayant renvoyé le questionnaire déclarent que les douleurs d'origine rhumatologiques sont complexes à traiter

Les médecins : orientation pour avis complémentaire

- Qu'il s'agisse des spécialistes ou des généralistes, les praticiens libéraux adressent le plus souvent leur patient pour avis à une structure dédiée à la prise en charge de la douleur. 323 praticiens (environ 81%) connaissent une structure de prise en charge de la douleur à proximité de leur lieu d'exercice.
- L'orientation vers un spécialiste est mentionné en deuxième position, par les généralistes comme par les spécialistes.

		Catégorie professionnelle		
		Médecins généralistes	Médecins spécialistes	Total
Avis complémentaire : vers qui orientez-vous votre patient ?	Structure dédiée	132	105	237
	Spécialiste	55	32	87
	Spécialiste + structure dédiée	26	13	39
	Généraliste	3	10	13
	Généraliste + spécialiste + structure dédiée	1	2	3
	Généraliste + spécialiste	0	2	2
	Généraliste + structure dédiée	0	2	2
	Total	217	166	383

		Réponses à la question 10 contenant l'adressage à une structure dédiée	
		Oui	Non
Connaissez-vous une structure de prise en charge de la douleur à proximité ?	Oui	253	
	Non		22
	Total	275	

Médecins ayant répondu aux deux questions

- Pour plus de la moitié des praticiens libéraux, l'amélioration passe par le perfectionnement grâce à des formations complémentaires.
- 45% mettent l'accent sur le développement des réseaux de soins et/ou des structures dédiées.

		Catégorie professionnelle					
		Médecins généralistes		Médecins spécialistes		Total	
		Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Comment améliorer la prise en charge de la douleur	Formations complémentaires	47	24,6%	36	24,0%	83	24,3%
	Développement de réseaux	38	19,9%	34	22,7%	72	21,1%
	Développement de structures dédiées	42	22,0%	26	17,3%	68	19,9%
	Structures dédiées & formations	22	11,5%	18	12,0%	40	11,7%
	Formation & développement de réseaux	19	9,9%	16	10,7%	35	10,3%
	Développement de structures dédiées et de réseaux	9	4,7%	13	8,7%	22	6,5%
	Formation + développement de réseaux et de structures	14	7,3%	7	4,7%	21	6,2%
	Total	191	100%	150	100%	341	100%

Enquête auprès des professionnels libéraux

Réponses des chirurgiens dentistes

■ LES RÉPONDANTS :

- ◆ 248 réponses pour 1465 questionnaires envoyés
- ◆ Taux de retour : 16,9 %
- ◆ Sex-ratio: 60% hommes / 40% femmes

■ LES REGIONS REPRESENTEES:

Les taux de réponses varient entre 3,4% en Picardie et 31,8% en Basse Normandie (hors Corse : pas de réponse)

- ◆ Bon taux de retour dans le Nord Pas de Calais, en Poitou Charentes et en Bourgogne
- ◆ Faible taux de retour en Haute Normandie et Champagne Ardennes


Les chirurgiens dentistes : formation initiale (1)

		Nombre	%	% hors réponses manquantes	% cumulé
Q1 : formation initiale	Oui	119	48,0	48,2	48,2
	Non	128	51,6	51,8	100,0
	Total	247	99,6	100	
	Réponses manquantes	1	0,4		
	Total	248	100		

- 247 répondants sur 248 ont répondu à la question 1.
- **Un peu plus de la moitié** déclarent de **pas avoir reçu de formation concernant la prise en charge de la douleur** au cours de leurs études.

- L'adaptation de la formation initiale suivie a été évaluée par 123 dentistes libéraux alors que 119 déclaraient avoir reçu un enseignement sur la douleur. Seules ces 119 réponses ont été analysées.
- La formation initiale est jugée tout à fait adaptée ou adaptée par 66% des répondants

	Nombre	%	% cumulé
Tout à fait d'accord	18	15,1%	15,1%
D'accord	61	51,3%	66,4%
Pas d'accord	38	31,9%	98,3%
Pas du tout d'accord	2	1,7%	100%
Total	119	100%	



Les chirurgiens dentistes : formation continue (1)

	Nombre	%	% (hors pas de réponse)	% cumulé
Participation à une session de formation continue traitant de la douleur ?	Oui	67	27,02	27,92
	Non	173	69,76	100
	Total	240	96,8	
	Pas de réponse	8	3,2	
	Total	248	100	

		Formation continue ?		
		Oui	Non	Total
Formation initiale ?	Oui	30	89	119
	Non	37	83	120
	Total	67	172	239

Prise en compte des praticiens ayant répondu aux deux questions uniquement

- La part des dentistes ayant participé à une session de formation continue sur la douleur est relativement faible : 27%.
- Il n'y a pas de relation significative entre le fait d'avoir suivi une formation initiale et le fait d'avoir participé à une session de formation continue

■ Les formations continues suivies par les chirurgiens dentistes sont des congrès ou des EPU dans plus de la moitié des cas.

- ◆ 11 chirurgiens dentistes qui n'avaient pas répondu oui à la question « Avez-vous suivi une formation sur la douleur après vos études ? » ont répondu à la question 3a concernant la nature de cette formation. Ces réponses n'ont pas été comptabilisées.

Avez-vous suivi une session de formation continue ?

	Oui		Non		Total	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
C	18	28,6%	4	36,4%	22	29,7%
EPU	18	28,6%	2	18,2%	20	27,0%
C + EPU	9	14,3%	0	0,0%	9	12,2%
FD	4	6,3%	3	27,3%	7	9,5%
S	5	7,9%	0	0,0%	5	6,8%
FD + C	3	4,8%	1	9,1%	4	5,4%
FD + EPU	1	1,6%	1	9,1%	2	2,7%
C + S + EPU	2	3,2%	0	0,0%	2	2,7%
C + S	1	1,6%	0	0,0%	1	1,4%
FD + C + EPU	1	1,6%	0	0,0%	1	1,4%
Total	63	100%	11	100%	74	100%

Sous quelle forme ?

Les chirurgiens dentistes : formation continue (3)

Cette formation vous a-t-elle paru adaptée ?

Quel type de formation continue avez-vous suivi ?	Tout à fait d'accord	D'accord	Pas d'accord	Pas du tout d'accord	Total
	FD	3 50,0%	3 50,0%	0 0,0%	0 0,0%
C	0 0,0%	11 61,1%	5 27,8%	2 11,1%	18 100%
S	1 25,0%	3 75,0%	0 0,0%	0 0,0%	4 100%
EPU	4 20,0%	12 60,0%	4 20,0%	0 0,0%	20 100%
FD + C	1 25,0%	2 50,0%	1 25,0%	0 0,0%	4 100%
FD + EPU	0 0,0%	2 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	2 100%
C + S	0 0,0%	1 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 100%
C + EPU	3 33,3%	6 66,7%	0 0,0%	0 0,0%	9 100%
FD + C + EPU	0 0,0%	1 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 100%
FD + S + EPU	0 0,0%	1 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	1 100%
C + S + EPU	2 100,0%	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	2 100%
Total	14 20,6%	42 61,8%	10 14,7%	2 2,9%	68 100%

FD : Formation diplômante / C : Congrès
S : séminaire pharmaceutique / EPU : Enseignement Post Universitaire

- Dans près de 80% des cas, la formation continue sur le thème de la douleur est jugée adaptée à l'exercice professionnel des chirurgiens dentistes.

- La source d'informations la plus utile pour les chirurgiens dentistes libéraux est la presse médicale suivie par l'industrie pharmaceutique et les associations professionnelles (citées par près de 30% des praticiens). Les universités arrivent en 4ème position avec 25% (soit 10 points de plus que chez les médecins).

Fournisseurs d'informations les plus utiles sur la douleur

	Nombre	%
Presse médicale	186	75,0%
Industrie pharmaceutique	133	53,6%
Associations professionnelles	73	29,4%
Universités	61	24,6%
Médecins référents douleur	25	10,1%
Agences nationales	13	5,2%
Ministère de la santé	3	1,2%

	Nombre	%
Conseils de prescription	138	55,6%
Recommandations professionnelles	107	43,1%
Informations sur les structures locales de prise en charge	99	39,9%
Présentations de sessions de FMC	84	33,9%
Présentation d'antalgiques	70	28,2%
Réglementation	51	20,6%

- Les informations les plus attendues par les chirurgiens dentistes libéraux concernent :
 - Les conseils de prescription
 - Les recommandations professionnelles
 - Les structures locales de prise en charge de la douleur.

- 87,1% des dentistes déclarent évaluer la douleur de leur patient. 11,3% ont répondu ne pas l'évaluer et 1,6% n'ont pas répondu.
- Concernant les moyens d'évaluation, 93% des répondants n'utilisent pas d'outil standardisé.

Comment évaluez vous la douleur de vos patients ?

		Avec un outil standardisé	Avec vos propres moyens	Avec les deux	Total
Évaluez-vous la douleur de vos patients ?	Oui	1	196	13	210
	Non	0	1	1	2
	Total	1	197	14	212

Les chirurgiens dentistes : prévention de la douleur induite par les soins (1)

	Nombre	%	% (hors réponses manquantes)	% cumulé	% cumulé
Prescrivez-vous un traitement préventif avant un acte douloureux ?	Souvent	70	28,2	38,7	64,1
	Parfois	46	18,5	64,1	
	Rarement	33	13,3	82,3	35,9
	Jamais	32	12,9	100	
Total	181	73,0	100		
Missing	67	27,0			
Total	248	100			

- Seulement 64,1% des dentistes déclarent prescrire un traitement préventif avant un acte douloureux
- Les 35,9% restants n'en prescrivent que rarement voire jamais

- Il n'y a pas de corrélation significative entre le nombre d'années d'exercice et à la prévention de la douleur induite

Nombre d'années d'installation

		<i>Moins de 10 ans</i>	<i>10 à 20 ans</i>	<i>21 à 30 ans</i>	<i>Plus de 31 ans</i>	<i>Total</i>
Souvent	Effectif	18	21	23	8	70
	%	35,3	44,7	41,1	32,0	39,1
Parfois	Effectif	14	9	13	9	45
	%	27,5	19,1	23,2	36,0	25,1
Rarement	Effectif	9	7	12	4	32
	%	17,6	14,9	21,4	16,0	17,9
Jamais	Effectif	10	10	8	4	32
	%	19,6	21,3	14,3	16,0	17,9
Total	Effectif	51	47	56	25	179
	%	100	100	100	100	100

Prescrivez-vous un traitement préventif avant un acte douloureux ?

Les chirurgiens dentistes : prévention de la douleur induite par les soins (3)

Prescrivez-vous un traitement préventif avant un acte douloureux ?								Total
	Anesthésique local	Antalgiques	Anxiolytiques	Anesthésique local + antalgique	Anesthésique local + anxiolytique	Antalgiques + anxiolytiques	Anesthésique local + antalgique + anxiolytique	
Souvent	21	15	0	19	2	6	7	70
Parfois	7	18	4	8	0	5	2	44
Rarement	6	13	3	3	1	3	2	31
Jamais	7	5	3	5	2	1	3	26
Total	41	51	10	35	5	15	14	171

- Les anesthésiques locaux sont prescrits par 56% des répondants aux deux questions.
- 115 dentistes ont déclaré donner des antalgiques (seuls ou en association), 44 des anxiolytiques
 - ◆ Il est à noter que 26 chirurgiens dentistes ayant répondu ne jamais donner de traitement préventif contre la douleur ont répondu à la question.

Les chirurgiens dentistes : prescription d'antalgiques de palier III (1)

- Moins de 10% des chirurgiens dentistes déclarent prescrire des antalgiques de palier III à leurs patients.
- Quand ils le font, c'est le plus souvent de leur propre initiative.

		Nombre	%	% hors réponses manquantes	Cumul
Prescrivez-vous des antalgiques de niveau III ?	Souvent	2	0,8	0,8	8,2
	Parfois	18	7,3	7,3	
	Rarement	59	23,8	24,1	91,8
	Jamais	166	66,9	67,8	
	Total	245	98,8	100	
	Missing	3	1,2		
	Total	248	100		

Les chirurgiens dentistes : prescription d'antalgiques de palier III (2)

Prescrivez vous des antalgiques de palier III ?

	Nombre	% hors réponses manquantes	% cumulé
Souvent	2	0,8	0,8
Parfois	18	7,3	8,2
Rarement	59	24,1	32,2
Jamais	166	67,8	100
Total	245	100	
Missing	3		
Total	248		

79

Pour des douleurs aiguës ?

	Nombre	% hors réponses manquantes	% cumulé
Souvent	48	64,9	64,9
Parfois	15	20,3	85,1
Rarement	9	12,2	97,3
Jamais	2	2,7	100
Total	74	100	
Missing	174		
Total	248		

Pour des douleurs chroniques ?

	Nombre	% hors réponses manquantes	% cumulé
Souvent	3	4,2	4,2
Parfois	9	12,5	16,7
Rarement	14	19,4	36,1
Jamais	46	63,9	100
Total	72	100	
Missing	176		
Total	248		

- 79 dentistes déclarent prescrire des antalgiques de niveau III.
- en grande majorité pour des douleurs aiguës (85%), beaucoup plus rarement pour des douleurs chroniques (11%)

Les chirurgiens dentistes : orientation pour avis complémentaire

Vers qui orientez vous votre patient pour un avis ?

	Nombre	%	% hors réponses manquantes	% cumulé
Médecin spécialiste	85	34,3	41,7	76,5
Médecin généraliste	71	28,6	34,8	34,8
Structure dédiée	26	10,5	12,7	89,2
Médecin généraliste + spécialiste	13	5,2	6,4	95,6
Médecin généraliste + structure dédiée	5	2,0	2,5	98,0
Médecin spécialiste + structure dédiée	4	1,6	2,0	100
Total	204	82,3	100	
Missing	44	17,7		
Total	248	100		

- Pour avis, 40% des dentistes adressent leur patient à un médecin spécialiste (& éventuellement à une autre structure) et 36% l'adressent à un généraliste (seulement ou avec un autre mode de prise en charge associé)
- Les structures dédiées sont relativement peu sollicitées par les chirurgiens dentistes.

		Réponses à la question 10 contenant l'adressage à une structure dédiée
Connaissez-vous une structure de prise en charge de la douleur à proximité ?	Oui	24
	Non	10
	Total	34

Chirurgiens dentistes ayant répondu aux deux questions

- 125 chirurgiens dentistes (soit près de 50% des 248 répondants) considèrent que les formations complémentaires sur le thème de la douleur, associées ou non à d'autres actions, permettraient d'améliorer la prise en charge des patients.
- 83 considèrent qu'il faut développer les réseaux et 62 les structures dédiées.
- Il est à noter que 68% des dentistes ne connaissent pas de structure dédiée à la prise en charge de la douleur à proximité de leur lieu d'exercice.

Qu'est ce qui contribuerait à améliorer la prise en charge de la douleur ?

	Nombre	%	% hors réponses manquantes	% cumulé
Formations complémentaires	73	29,4	37,2	46,4
Développement des réseaux	43	17,3	21,9	68,4
Développement de structures & formations complémentaires	22	8,9	11,2	79,6
Développement de structure dédiée	18	7,3	9,2	9,2
Formations complémentaires & réseaux	18	7,3	9,2	93,9
Formation, développement de structures & de réseaux	12	4,8	6,1	100
Développement de structures dédiées & de réseaux	10	4,0	5,1	84,7
Total	196	79,0	100	
Missing	52	21,0		
Total	248	100		

Enquête auprès des professionnels libéraux

Réponses des infirmières

■ LES REpondants

- 201 réponses pour 2313 questionnaires envoyés
- Taux de retour : 8,7%
- Sex-ratio: 18% hommes / 82% femmes

■ LES REGIONS REPRESENTÉES:

Les taux de réponses varient entre 2,9% dans le Limousin et 14,8% en Midi Pyrénées

- Bon taux de retour en Auvergne, Haute et Basse Normandie et en France Comté.
- Faible taux de retour en Ile de France et en Aquitaine

Avez-vous reçu au cours de votre formation initiale des cours sur la prise en charge de la douleur ?


	Nombre	%	% hors réponses manquantes
Oui	59	29,4	29,8
Non	139	69,2	70,2
Total	198	98,5	100
Missing	3	1,5	
Total	201	100	

Votre formation initiale sur la prise en charge de la douleur est-elle adaptée à votre exercice ?

Tout à fait d'accord	D'accord	Pas d'accord	Pas du tout d'accord	Total
7	25	22	3	57

Analyse réalisées sur les infirmières ayant répondu "oui" à la question 1 & ayant donné une réponse à la question 2 (manque 2 IDE)

Votre formation initiale sur la prise en charge de la douleur est-elle adaptée à votre exercice ?



- Moins de 30% des répondants ont eu des cours traitant de la prise en charge de la douleur pendant leur formation initiale.
- 44% ont trouvé cette formation mal adaptée voire inadaptée.
- Les infirmières dont le nombre d'années d'installation est le plus faible sont celles chez qui le taux de formation initiale sur la douleur est le plus élevé.

Les infirmières : formations complémentaires (1)

- 101 répondants ont suivi une formation complémentaire sur le thème de la douleur.
- Il n'y a pas de lien statistiquement significatif sur l'échantillon entre le fait d'avoir reçu une formation initiale sur la douleur et le choix de suivre une formation complémentaire.

Formation complémentaire ?

		Oui	Non	Total
Formation initiale ?	Oui	31	26	57
	Non	70	63	133
	Total	101	89	190

Les infirmières : formations complémentaires (2)

Quel(s) type(s) de formation(s) complémentaire(s) avez-vous reçu ?	Avez-vous reçu une formation complémentaire ?		
	Oui	Non	Total
C	22	1	23
FD	16	0	16
EPU	8	0	8
S	6	1	7
C + EPU	2	0	2
FD + C	1	0	1
FD + S	1	0	1
FD + EPU	1	0	1
S + C	1	0	1
Total	58	2	60
Pas de réponse à l'une ou l'autre des questions	141		

FD : Formation diplômante / C : Congrès
S : séminaire pharmaceutique / EPU : Enseignement Post Universitaire

- Les congrès professionnels constituent le principal type de formation complémentaire suivie par les infirmières libérales.
- 14% des infirmières qui ont répondu à la question ont suivi une formation diplômante.
 - ✓ 2 personnes ayant répondu ne pas avoir reçu de formation complémentaire ont précisé le type de formation reçue.

Les infirmières : formations complémentaires (3)

- Globalement, plus de 90% des infirmières considèrent que l'enseignement complémentaire qu'elles ont reçu concernant la prise en charge de la douleur est adapté à leur exercice professionnel.
- Le tableau ci dessous représente la satisfaction des infirmières libérales ayant suivi un seul type de formation

	Tout à fait d'accord	D'accord	Pas d'accord	Pas du tout d'accord	Total
Formation Diplômante	10	3	1	1	15
Congrès	11	10	0	0	21
Séminaires pharmaceutiques	2	3	1	0	6
Enseignement Post Universitaire	2	5	0	0	7
Total	25	21	2	1	49

Evaluation des taux de satisfaction des infirmières ayant participé à un seul type de formation complémentaire

Fournisseurs d'informations
les plus utiles sur la douleur

	Nombre	%
Presse médicale	112	55,7
Médecin référent douleur	85	42,3
Associations professionnelles	70	34,8
Industrie pharmaceutique	49	24,4
Associations de patients	26	12,9
Agences nationales	5	2,5
Universités	5	2,5
Ministères	3	1,5
Total	355*	

* : Le total est supérieur à 201 car les infirmières pouvaient cocher jusqu'à 3 cases

- Pour plus de la moitié des répondants, **la presse médicale** est le meilleur moyen d'obtenir des informations utiles sur la douleur.
- Le **médecin référent douleur** vient en seconde position avec 42%, suivi des **associations professionnelles**.
- **L'industrie pharmaceutique** est citée par un quart des répondants.

	Quelles informations vous manquent le plus ?	
	Nombre	%
Conseils de prescription	99	49,3
Information sur les structures spécialisées	93	46,3
Recommandations professionnelles	92	45,8
Présentations d'antalgiques	72	35,8
Présentations de formations	71	35,3
Réglementation	58	28,9
Total	485*	

* : Le total est supérieur à 201 car les infirmières pouvaient cocher jusqu'à 3 cases

- Les informations qui manquent le plus aux infirmières sont les « conseils de prescription ».
 - Dans la mesure où les infirmières ne prescrivent pas, on peut supposer qu'il s'agit de conseils d'utilisation, d'administration ou de surveillance des traitements antalgiques.
- Les attentes envers une information sur les structures spécialisées sont presque aussi fortes.

- Plus de 83% des répondants déclarent évaluer la douleur de leurs patients.
- 25% d'entre elles déclarent utiliser un outil standardisé.
- Dans plus de 95% des cas, l'outil cité est l'Echelle Visuelle Analogique

	Nombre	%	% hors réponses manquantes	% cumulé
Oui	160	79,6	83,8	83,8
Non	31	15,4	16,2	100
Total	191	95,0	100	
Missing	10	5,0		
Total	201	100		

	Evaluez-vous la douleur de vos patients ?		
	Oui	Non	Total
Avec un outil standardisé	16	0	16
Par vos propres moyens	101	6	107
Avec un outil standardisé et par vos propres moyens	31	0	31
Total	148	6	154

Les infirmières : prévention de la douleur induite par les soins

	Nombre	%	% hors réponses manquantes	% cumulé
Utilisez-vous un traitement préventif avant un acte douloureux ?	Souvent	100	49,8	52,6
	Parfois	63	31,3	85,8
	Rarement	23	11,4	12,1
	Jamais	4	2,0	2,1
	Total	190	94,5	100
	Missing	11	5,5	
	Total	201	100	

- 85,8% des infirmières ayant répondu à la question 7 déclarent demander « souvent » ou « parfois » un traitement préventif de la douleur avant un acte thérapeutique ou diagnostique douloureux.

- Le médecin généraliste est le premier interlocuteur (68,3%) vers lequel se tournent les infirmières libérales pour avoir un avis complémentaire sur la prise en charge de la douleur des patients.
- 41,9% orientent leurs patients vers une structure dédiée à la douleur
- Le médecin spécialiste n'est cité que par 15 infirmières.

		Réponses à la question 10 contenant une structure dédiée
Connaissez-vous une structure dédiée à proximité de votre lieu d'exercice ?	Oui	64
	Non	5
	Total	69

Infirmières ayant répondu aux deux questions

- 188 infirmières ont répondu à la question 11. Près de 64% d'entre elles savent où se trouve un centre dédié à proximité de leur lieu d'exercice

Vers qui orientez-vous vos patients pour avis complémentaire ?

	Nombre	%	% hors réponses manquantes	% cumulé
Médecin généraliste	78	38,8	46,7	46,7
Structure dédiée à la douleur	40	19,9	24,0	77,2
Médecin généraliste & structure dédiée	24	11,9	14,4	96,4
Médecin spécialiste	11	5,5	6,6	53,3
Médecin généraliste & médecin spécialiste	8	4,0	4,8	82,0
Médecin généraliste, médecin spécialiste & structure dédiée	4	2,0	2,4	100
Médecin spécialiste & structure dédiée	2	1,0	1,2	97,6
Total	167	83,1	100	
Missing	34	16,9		
Total	201	100		

- Comme proposition visant à améliorer la prise en charge de la douleur, les infirmières ont cité, dans l'ordre, les éléments suivants :
 - ◆ Les réseaux (cités par plus de 60% des répondants)
 - ◆ Les formations (55%)
 - ◆ Les structures dédiées, mentionnées dans 42% des réponses

	Nombre	%	% hors réponses manquantes	% cumulé
Développement de réseaux	42	20,9	25,0	54,8
Formations complémentaires	29	14,4	17,3	29,8
Formations & développement de réseaux	26	12,9	15,5	88,1
Développement de structures dédiées	21	10,4	12,5	12,5
Développement de structures dédiées et de réseaux, formations	20	10,0	11,9	100
Développement de centres dédiés & formations	17	8,5	10,1	64,9
Développement de centres dédiés & de réseaux	13	6,5	7,7	72,6
Total	168	83,6	100	
Missing	33	16,4		
Total	201	100		

Enquête auprès des professionnels libéraux

Réponses des sages-femmes

■ LES REpondants :

- ◆ 17 réponses pour 85 questionnaires envoyés
- ◆ Taux de retour: 20%
- ◆ Sex-ratio: 100% femmes

■ LES REGIONS REPRESENTÉES:

Les taux de réponses varient entre 0% en Bourgogne et 100% en Franche Comté, mais le nombre des sages-femmes interrogées dans chaque région est trop faible pour obtenir une comparaison significative des taux de retour


Les sages-femmes : formation initiale

- Les 17 sages-femmes de l'échantillon ont répondu à la question 1 (et éventuellement 2).
- 7 sages-femmes sur 17 (41,2%) déclarent avoir reçu au cours de leurs études une formation sur la prise en charge de la douleur.

	Nombre	%
Oui	7	41,2
Non	10	58,8
Total	17	100

Formation initiale ?

Cette formation initiale était-elle adaptée ?			
Tout à fait d'accord	D'accord	Pas d'accord	Pas du tout d'accord
0	1	6	0



- L'appréciation sur la formation reçue est globalement défavorable avec 6 affirmations « pas d'accord » et une seule « d'accord ».

Les sages-femmes : formations complémentaires

		Formation complémentaire ?		
		Oui	Non	Total
Formation initiale ?	Oui	2	5	7
	Non	3	6	9
	Total	5	11	16

1 sage-femme n'a pas répondu à la question 3 concernant la formation complémentaire

- 5 sages-femmes sur les 16 ayant répondu à la question 3 ont suivi une formation complémentaire traitant de la douleur.
- Seules 2 répondantes ont suivi les deux formations soit 12,5%.

		Cette formation était-elle adaptée ?						
		Nombre	%	Tout à fait d'accord	D'accord	Pas d'accord	Pas du tout d'accord	Total
De quel type était votre formation complémentaire ?	Formation diplômante	1	33,3	0	0	1	0	1
	Congrès professionnels	1	33,3	0	1	0	0	1
	Formation diplômante + Enseignement Post Universitaire	1	33,3	0	1	0	0	1
	Total	3	100	0	2	1	0	3

- Le faible nombre de réponses ne permet pas d'apprécier l'adéquation de la formation complémentaire avec l'exercice professionnel.

- La presse médicale est le premier vecteur d'information sur la prise en charge de la douleur.
- L'industrie pharmaceutique est totalement absente

	Nombre	%
Presse médicale	12	70,6
Associations professionnelles	6	35,3
Associations de patients	4	23,5
Médecin référent douleur	3	17,6
Universités	2	11,8
Ministères	0	0,0
Agences nationales	0	0,0
Industrie pharmaceutique	0	0,0
Total	27*	

Le total est supérieur à 17 car chaque sage-femme pouvait donner jusqu'à trois réponses

Quelles sont les informations qui vous manquent le plus ?

	Nombre	%
Présentations de formations	11	64,7%
Recommandations professionnelles	8	47,1%
Conseils de prescription	7	41,2%
Informations sur les structures de prise en charge	6	35,3%
Présentations d'antalgiques	6	35,3%
Réglementation	1	5,9%

La présentation de formations & les recommandations professionnelles sont les informations qui manquent le plus aux sages-femmes libérales.

	Nombre	%	% hors réponses manquantes	% cumulé
Oui	14	82,4	87,5	87,5
Non	2	11,8	12,5	100
Total	16	94,1	100	
Missing	1	5,9		
Total	17	100		

Évaluez-vous la douleur de vos patients ?

	Nombre	%
Avec un outil standardisé	1	7,1
Avec mes propres moyens	12	85,7
Avec un outil standardisé et mes propres moyens	1	7,1
Total	14	100

Comment évaluez-vous la douleur de vos patients ?

- 87,5% des sages-femmes qui ont répondu à la question déclarent évaluer la douleur de leurs patientes.
- Le plus souvent (12 sur 14), cette évaluation n'est pas effectuée avec un outil standardisé

Les sages-femmes : prévention de la douleur induite par les soins

Prescrivez-vous des
antalgiques en préventif
?

	Nombre	%	% hors missing	% cumulé
Souvent	3	17,6	25,0	25,0
Parfois	2	11,8	16,7	41,7
Rarement	3	17,6	25,0	66,7
Jamais	4	23,5	33,3	100
Total	12	70,6	100	
Missing	5	29,4		
Total	17	100		

Comment évaluez-vous la douleur de vos patients ?

	Nombre	%
Antalgique	2	25%
sans réponse	6	75%
Total	8	100%

- Seules 5 sages-femmes sur les 12 qui ont répondu à cette question prescrivent ou sollicitent « souvent » ou « parfois » la prescription d'un traitement préventif contre la douleur induite par les soins.

- Le médecin spécialiste est le principal interlocuteur (69,2%) vers lequel se tournent les sages-femmes libérales pour avoir un avis complémentaire sur la prise en charge de la douleur.
- Le médecin généraliste ou les structures dédiées sont peu cités par les sages-femmes libérales.

Réponses à la question 10 contenant une structure dédiée

	Nombre	%	% hors "missing"
Oui	5	29,4%	45,5%
Non	6	35,3%	54,5%
Total	11	64,7%	100,0%
"missing"	6	35,3%	
Total	17	100,0%	

Connaissez-vous une structure dédiée à proximité de votre lieu d'exercice ?

- 17 sages-femmes ont répondu à la question 11. Moins de 30% d'entre elles déclarent savoir où se trouve un centre dédié à proximité de leur lieu d'exercice

Vers qui orientez-vous vos patients pour avis complémentaire ?

	Nombre	%	% hors Missing	% cumulé
Médecin généraliste	1	5,9%	7,7%	7,7%
Médecin généraliste & médecin spécialiste	1	5,9%	7,7%	15,4%
Médecin généraliste, médecin spécialiste & structure dédiée	1	5,9%	7,7%	23,1%
Médecin spécialiste	9	52,9%	69,2%	92,3%
Structure dédiée à la douleur	1	5,9%	7,7%	100,0%
Total	13	76,5%	100,0%	
Missing	4	23,5%		
Total	17	100,0%		

- Le développement de réseaux des professionnels est mentionné à 64,3%
- Se perfectionner grâce à des formations complémentaires : 57,1%.
- Développer les structures dédiées de prise en charge : 35,7%

	Nombre	%	% hors Missing	% cumulé
Développement de centres dédiés & formations	2	11,8%	14,3%	14,3%
Développement de centres dédiés & de réseaux	3	17,6%	21,4%	35,7%
Formations complémentaires	3	17,6%	21,4%	57,1%
Formations & développement de réseaux	3	17,6%	21,4%	78,6%
Développement de réseaux	3	17,6%	21,4%	100,0%
Total hors Missing	14	82,4%	100,0%	
Missing	3	17,6%		
Total	17	100,0%		

Enquête auprès des professionnels libéraux

Réponses des kinésithérapeutes

■ LES REpondants :

- 208 réponses pour 1682 questionnaires envoyés
- Taux de retour: 12,4%
- Sex-ratio: 65% hommes / 35% femmes

■ LES REGIONS REPRESENTÉES:

Les taux de réponses varient entre 5,6% en Ile de France et 27,8% en Franche Comté (hors Guadeloupe et Corse : pas de réponse).

- Bon taux de retour en Bourgogne et en Picardie
- Faible taux de retour en PACA et en Haute Normandie


Avez-vous reçu au cours de votre formation initiale des cours sur la prise en charge de la douleur ?

	Nombre	%
Oui	82	39%
Non	126	61%
Total	208	100%

Tous les kinésithérapeutes ont répondu à la question 1

Cette formation initiale était-elle adaptée ?			
Tout à fait d'accord	D'accord	Pas d'accord	Pas du tout d'accord
10	53	16	2

- 82 répondants sur 208 (39%) ont déclaré avoir reçu une formation sur la prise en charge de la douleur au cours de leurs études.
- Le taux de satisfaction sur la formation reçue est de 77%



Les kinésithérapeutes : formations complémentaires (1)

Formation complémentaire ?

		Oui	Non	Total
Formation initiale ?	Oui	22	57	79
	Non	22	97	119
	Total	44	154	198

10 kinésithérapeutes n'ont pas répondu à la question 3

- Seulement **22%** des répondants ont suivi une formation complémentaire, principalement des formations diplômantes.
- 93,3% des répondants estiment que leur formation continue est adaptée à leur exercice (**taux de satisfaction = 82%**)

	Tout à fait d'accord	D'accord	Pas d'accord	Pas du tout d'accord	Total hors Missing	Total
Formation Diplômante	5	4	1	0	10	11
Congrès	3	3	0	0	6	6
Séminaires pharmaceutiques	0	3	1	0	4	6
Enseignement Post Universitaire	4	6	0	0	10	11
Total	12	16	2	0	30	34

Evaluation des taux de satisfaction des kinésithérapeutes ayant participé à un seul type de formation complémentaire (n=34 kinésithérapeutes)

Les kinésithérapeutes : formations complémentaires (2)

- Sur les 44 répondants déclarant avoir suivi une formation continue, 38 en ont précisé la nature :
 - ◆ 47% ont suivi un ou des enseignements post-universitaires (EPU)
 - ◆ 34,2% ont suivi d'une formation diplômante
 - ◆ 23,7% ont assisté à des congrès professionnels
 - ◆ 23,7% ont assisté à des séminaires de l'industrie pharmaceutique

Avez-vous suivi une formation complémentaire ?

Quel(s) type(s) de formation(s) complémentaire(s) avez-vous reçu ?	Oui		Non		Total	
	nombre	%	nombre	%	nombre	%
	FD	7	18,4%	2	66,7%	9
FD + C	1	2,6%	0		1	2,4%
FD + S	1	2,6%	0		1	2,4%
FD + EPU	1	2,6%	0		1	2,4%
FD + C + EPU	1	2,6%	0		1	2,4%
FD + S + EPU	3	7,9%	0		3	7,3%
C	6	15,8%	0		6	14,6%
C + S	1	2,6%	0		1	2,4%
C + EPU	2	5,3%	0		2	4,9%
S	4	10,5%	1	33,3%	5	12,2%
EPU	11	28,9%	0		11	26,8%
Total	38	100,0%	3	100,0%	41	100,0%
Pas de réponse à l'une ou l'autre des questions	167				83,7%	

7 kinésithérapeutes n'ont répondu ni à la 3 ni à la 3a

- La presse médicale apparaît comme le premier vecteur de communication sur la prise en charge de la douleur (68,3%).
- Les associations de professionnels et les **associations d'usagers** arrivent respectivement en deuxième et troisième position.

Fournisseurs d'informations les plus utiles sur la douleur

	Nombre	%
Presse médicale	142	68,3%
Association de professionnels	58	27,9%
Associations d'usagers et de patients	40	19,2%
Médecins référents douleurs	39	18,8%
Agences nationales	27	13,0%
Industrie pharmaceutique	24	11,5%
Universités	12	5,8%
Ministère de la santé	4	1,9%
Total	346*	

* : Le total est supérieur à 208 car les kinésithérapeutes pouvaient cocher jusqu'à 3 cases

- L'information sur les **structures spécialisées**, les **recommandations professionnelles** et les **présentations de formations** sont les informations qui manquent le plus aux répondants.

Quelles informations vous manquent le plus ?

	Nombre	%
Information sur les structures spécialisées	120	58%
Recommandations professionnelles	88	42%
Présentations de formations	78	38%
Conseils de prescription	60	29%
Présentations d'antalgiques	31	15%
Réglementation	29	14%
Total	406*	

* : Le total est supérieur à 208 car les kinésithérapeutes pouvaient cocher jusqu'à 3 cases

- 92,7% des répondants déclarent évaluer la douleur de leurs patients.
- L'utilisation d'un outil standardisé n'est mentionnée que par un tiers des répondants.

		Nombre	%	% hors missing	% cumulé		
Évaluez-vous la douleur de vos patients ?	Oui	190	91,3%	92,7%	92,7%		
	Non	15	7,2%	7,3%	100,0%		
	Total	205	98,6%	100,0%			
	Missing	3	1,4%				
	Total	208	100,0%				
				Oui	%	% hors missing	% cumulé
Comment évaluez-vous la douleur de vos patients ?	Avec un outil standardisé		15	7,9%	8,0%	8,0%	
	Par vos propres moyens		125	65,8%	66,8%	74,9%	
	Avec un outil standardisé et par vos propres moyens		47	24,7%	25,1%	100,0%	
	Total hors missing		187	98,4%	100,0%		
	Missing		3	1,6%			
	Total		190	100,0%			

Les kinésithérapeutes : prévention de la douleur induite par les soins

- Une majorité de répondants (55,2%) déclarent demander « souvent » ou « parfois » un traitement préventif de la douleur.
- Il n'y a pas de relation significative entre les formations sur la prise en charge de la douleur suivies et la demande de traitements préventifs...
- ... ni de relation significative entre la demande d'un traitement préventif et le nombre d'années d'installation.

Utilisez-vous un traitement préventif avant un acte douloureux ?

	Nombre	%	% hors réponses manquantes	% cumulé
Souvent	29	13,9%	14,9%	14,9%
Parfois	78	37,5%	40,2%	55,2%
Rarement	47	22,6%	24,2%	79,4%
Jamais	40	19,2%	20,6%	100,0%
Total	194	93,3%	100,0%	
Missing	14	6,7%		
Total	208	100,0%		

- Le médecin généraliste est le principal interlocuteur (35,7%) vers lequel se tournent les kinésithérapeutes libéraux pour avoir un avis complémentaire sur la prise en charge de la douleur
- 66 kinés ont répondu à la question 11. Près de 90% d'entre eux savent où se trouve un centre dédié à proximité de leur lieu de travail

Réponses à la question 10 contenant une structure dédiée

	Nombre	%	% hors missing	% cumulé
Oui	59	88,1%	89,4%	89,4%
Non	7	10,4%	10,6%	100,0%
Total hors missing	66	98,5%	100,0%	
Missing	1	1,5%		
Total	67	100,0%		

Connaissez-vous une structure dédiée à proximité de votre lieu d'exercice ?

Kinésithérapeutes ayant répondu aux deux questions

	Nombre	%	% hors réponses manquantes	% cumulé
Médecin généraliste	70	33,7%	35,7%	35,7%
Structure dédiée à la douleur	46	22,1%	23,5%	59,2%
Médecin spécialiste	38	18,3%	19,4%	78,6%
Médecin généraliste & médecin spécialiste	18	8,7%	9,2%	87,8%
Médecin généraliste & structure dédiée	15	7,2%	7,7%	95,4%
Médecin spécialiste & structure dédiée	6	2,9%	3,1%	98,5%
Médecin généraliste, médecin spécialiste & structure dédiée	3	1,4%	1,5%	100,0%
Total	196	94,2%	100,0%	
Missing	12	5,8%		
Total	208	100,0%		

Vers qui orientez-vous vos patients pour avis complémentaire ?

Pour les kinésithérapeutes ayant répondu à l'enquête, l'amélioration de la prise en charge de la douleur passe principalement par :

1. Le développement des réseaux de professionnels (44,7 %)
2. L'augmentation du nombre de formations complémentaires (41,3%)
3. Le développement des structures dédiées de prise en charge (38 %)

	Nombre	%	% hors Missing	% cumulé
Formations complémentaires	49	23,6%	27,4%	27,4%
Développement de réseaux	44	21,2%	24,6%	52,0%
Développement de structures dédiées	38	18,3%	21,2%	73,2%
Formations & développement de réseaux	18	8,7%	10,1%	83,2%
Développement de structures dédiées et des réseaux, formation	13	6,3%	7,3%	90,5%
Développement de centres dédiés & formations	12	5,8%	6,7%	97,2%
Développement de centres dédiés & de réseaux	5	2,4%	2,8%	100,0%
Total	179	86,1%	100,0%	
Missing	29	13,9%		
Total	208	100,0%		